



SPIREN

5 november 2018

HEDEGAARD

Tidspunkt for optimal behandling med Kerb 400 SC i vinterraps

Jordtemperaturen falder og er pt. flere steder under 10°C. Skal der udføres en behandling med Kerb, er det en fordel at udføre den primo november, da bedste effekt opnås, når græsukrudtet er småt. Sprøjt gerne forud for let nedbør med god vandmængde (mindst 200 l/ha vand) og størst mulig dråbestørrelse brug eks. en Billericay rødbrun 035 dyse.

Anvendelse og dosering

I marker med stor forekomst af græsukrudt anbefaler vi altid en behandling med Kerb 400 SC. I sædskifter med frøgræs bør der altid anvendes Kerb. Kerb har en anden virkemåde end andre græsmidler og er derfor en effektiv resistensbryder.

Kerb 400 SC har også effekt på fuglegræs, men generelt er virkningen på andre tokimbladede ukrudtsarter begrænset.

1,25 l/ha Kerb 400 SC anbefales mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter, væselhale, vindaks, fuglegræs og enårig rapgræs.

Mod stor væselhale er max godkendt mængde på 1,25 l/ha Kerb ikke tilstrækkeligt (normalt ses bekæmpelse kun hvor sprøjten har overlappet)

For optimal effekt af de 1,25 l/ha, køр på så små planter som muligt!

1,0 l/ha Kerb er tilstrækkelig mod moderat forekomst af enårig rapgræs og spildkorn.

Regler for anvendelse af Kerb 400 SC

Miljøstyrelsen har udvidet den ordinære godkendelse af Kerb 400 SC til også at omfatte vinterraps. Vilkaarene for den nye godkendelse svarer nogenlunde til de dispensationer, som har været givet de senere år, men der er dog nogle ændringer:

- Behandlingsperioden er begrænset til november og december.
- Kerb må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling
- Der er ikke længere krav om, at sprøjteførerer skal sidde i en lukket førerkabine med kulfilter.