

Ukrudtsbekæmpelse i majs

I de tidligst såede majsmarker er det tid at bekæmpe ukrudt. En god og bred kombination til 1. sprøjtning er **5,6 g Harmony SX + 0,5-0,6 l Callisto + 0,5 l Renol** pr. ha efterfulgt 10-12 dage senere af **50-75 g Maister + 0,67-1,0 l MaisOil + 0,5 l Callisto** pr. ha. **Er der mange snerlepileurter tilsættes 0,15 l pr. ha Starane 333 HL til 2. sprøjtning.** Er der efter første sprøjtning fortsat mange storke-/hejrenæb, tilsættes 0,75-1,0 l Fighter 480 pr. ha til 2. sprøjtning. se løsningstabellen på næste side.



Harmony SX er en alsidig blandingspartner til bekæmpelse af blandt andet alle pileurter, hanekro, kamille, hvidmelet gåsefod, små stedmoder, storke- og hejrenæb og forstærker effekten af Callisto mod ærenpris. Der må maks. anvendes 5,6 g pr. ha pr. sæson. Kan anvendes til majsens 8-bladstadiet.

Callisto og Meristo må anvendes **op til 3 gange pr sæson**, hvilket giver bedre mulighed for at kontrollere problemukrudt som sort natskygge, tidsler, gråbynke og andet rodukrudt. Kan anvendes til majsens 8-bladstadiet.

Stort ukrudtstryk med skærmaks, hanespore, agermynte og græsukrudt

Hvor der er problemer med **skærmaks, hanespore og græsukrudt** anbefales tilsætning af **Maister + MaisOil** til første sprøjtning, såfremt hanespore og grøn skærmaks er spiret frem.

Det er vigtigt, at ukrudtet ikke bliver for stort før bekæmpelse.

Alternativt vil en strategi med 80-100 g Maister pr. ha i 2. sprøjtning og 50 g pr. ha i en eventuel 3. sprøjtning give en god bekæmpelse. Callisto har ved fuld dosering god effekt mod hanespore, men utilstrækkelig effekt mod grøn skærmaks.

Sort natskygge

Natskygge fremspirer ofte sent og bliver derved mindre påvirket af de tidlige sprøjtninger.

Derfor foreslås en 3-delt strategi på arealer med natskygge. Callisto og Maister er effektive mod sort natskygge. Maister kan anvendes, indtil majsens har 8 blade.

Agertidse og gråbynke

Callisto har god effekt mod både agertidse og gråbynke. Skuddene skal være godt fremme på sprøjtetidspunktet, dog må gråbynkerne ikke blive for store, dvs. max. 10-15 cm. Benyt en 3-delt sprøjtning med 0,5 l Callisto pr. ha hver gang, der er nye skud tilstrækkeligt fremme. I første sprøjtning skal der dog primært tages hensyn til størrelsen af det øvrige ukrudt.

Tabel 1. Ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.

Problem	Middel	Dosis pr. ha	Bemærkninger
Ærenpris	DFF/Legacy 500 SC (Mindre anvendelse)	75 ml.	Der anvendes 75 ml før fremspiring. Avler SKAL være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.
Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs, storkenæb, pileurt	Første sprøjtning: Callisto/Meristo + Harmony SX + Renol Anden sprøjtning: Maister + Maisoil + Calisto/Meristo + Fighter 480 eller Anden sprøjtning: Maister + Maisoil + Starane 333 HL	0,5-0,75 ltr. + 5,6 g + 0,5 ltr. 50 g + 0,67 ltr. + 0,5-0,6 ltr. + 0,5 ltr. 50-75 g + 0,67-1,0 ltr. + 0,15 ltr.	Det er vigtigt at første sprøjtning bliver udført på ukrudtets kimbladstadiet. Er der ærenpris bør doseringen af Calisto/Meristo øges til 0,75 ltr. Tilsætning af Renol øger effekten på bl.a. ærenpris. Anden sprøjtning udføres 10-12 dage efter første sprøjtning. Ved mange storke-/hejrenæb tilsættes Fighter 480. Er der mange snerlepilurter bør der tilsættes Starane 333 HL. Kan bruges i marker med et mindre ukrudtstryk.
Stort ukrudtstryk med skærmaks, hanespore og kvik	Første sprøjtning: Callisto/Meristo + Maister + Maisoil + Harmony SX Anden sprøjtning: Callisto/Meristo + Maister + Maisoil	0,5 ltr + 50 g + 0,5-0,67 ltr. + 5,6 g 0,5 ltr + 75 g + 0,67-1,0 ltr.	Der sprøjtes på ukrudtets kimbladstadiet. Er der græsser, er det vigtigt, at de er fremspiret på behandlingstidspunktet. Ellers brug løsningen ovenfor. Anden sprøjtning udføres 10-12 dage efter første sprøjtning. Ved agermynte, følfod, kærgaltetand, vandpilurt, svinemælde, hanespore og skærmaks: anvend IKKE under 125 g Maister total.