



## Bekæmpelse af kamille i vinterraps

### **Galera skal anvendes inden blomsterknopperne kan ses!**

Er der behov for kamillebekæmpelse i rapsen og ønsker man at anvende Galera, skal bekæmpelsen i de længst udviklede marker foretages snarest muligt. Galera skal anvendes inden blomsterknopperne kan ses og senest i stadie 50 (se billede 1).

**Der er stor risiko for afgrødeskade ved for sen anvendelse = ulovlig anvendelse, hvorfor det er vigtigt, at man har helt styr på rapsens udviklingstrin inden udsprøjtning!**

Galera kan anvendes fra 8-9°C i en periode uden nattefrost både før og efter sprøjtning.

**0,3 l/ha Galera + 0,3 l/ha PG 26 N.** Husk, at Galera ikke må anvendes i sorterne Quartz og Mendel.



**Billede 1.** Rapsplanten på det store billede er meget tæt på st. 50. Planten på det lille billede er i st. 51, og det er **for sent** at sprøjte, da blomsterknopperne ikke længere er dækket af blade. Rapsmarken tjekkes nøje før en evt. behandling med Galera.

En anden og mere skånsom mulighed for rapsen kan være, at anvende Matrigon til bekæmpelse af kamille. Her skal man dog afvente lunere temperaturer for optimal virkning.

**Matrigon 110 g/ha + 0,5 L/ha Renol**, kan udsprøjtes fra 10 grader C på dage med udsigt til stigende temperaturer. Optimum for Matrigon er 15-16 grader C og høj luftfugtighed. Sidste lovlige frist for udsprøjtning af Matrigon er rapsens stadie 55.